

B형간염

B형간염 예방접종에 대한 안내문입니다.

B형간염 예방접종 대상과 접종시기

B형간염 예방접종 대상과 접종시기는?

- 접종대상 : 모든 영·유아
- 권장 접종시기

	출생	1개월	6개월
B형간염	1차 (기초)	2차 (기초)	3차 (기초)

이럴 땐 예방접종을 받아서는 안됩니다

- 백신 구성 성분이나 이전에 B형간염 예방접종 후 심한 알레르기 반응이 있었던 경우
- 급성질환을 앓고 있는 경우에는 증상이 호전될 때까지 접종을 연기합니다.
 - ※ 경한 호흡기 감염, 설사 등과 같이 가벼운 질환은 금기 사항이 아닙니다

예방접종 후 알아두어야 합니다

예방접종 후 주의사항

- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물러 관찰합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰합니다.
- 접종부위는 청결히 합니다.
- 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며, 고열이 있거나 평소와 다른 신체증상이 나타나면 곧 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 이상반응이 생기면?

- 예방접종 부위의 통증, 발적, 압통, 부종이나, 약간의 두통, 근육통, 발열, 오심과 같은 경미한 이상반응은 일반적으로 접종 후에 나타날 수 있는 정상 면역반응으로 볼 수 있으니, 2~3일 지켜 보세요. 그러나 이러한 증상들이 심해지거나 지속되는 경우 또는 다른 전신 이상반응이 생기는 경우 즉시 의료기관을 방문하시기 바랍니다.
- 또한 관할 보건소에 신고하거나 예방접종도우미사이트(<http://nip.cdc.go.kr>)의 「이상반응 신고하기」를 통해 신고합니다.

예방접종피해 국가보상제도란?

- 정부는 1995년부터 예방접종 후 이상반응이 발생하면 예방접종과의 관련성을 심의하여 진료비를 보상하는 『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있습니다.
 - ※ 자세한 사항은 접종받은 기관이나 보건소에 문의하시거나, 예방접종도우미사이트(<http://nip.cdc.go.kr>)를 방문하시기 바랍니다.

B형간염 예방접종의 안전성과 이상반응

B형간염 예방접종의 안전성

- B형간염 백신은 심한 알레르기 반응과 같은 이상반응을 일으킬 수 있지만 매우 드물며, 임신이나 수유 및 면역 억제 상태에서도 접종을 할 수 있는 안전한 백신입니다.

B형간염 예방접종 후 발생가능한 이상반응은?

- 국소 이상반응
 - 접종부위의 통증, 종창, 경결
- 전신 이상반응
 - 발열, 권태, 구토, 관절통, 피부발진



보건복지부



질병관리본부

B형간염이란?

- B형간염은 B형간염 바이러스에 의해 급성 또는 만성으로 간에 염증이 발생하는 질환입니다.
- 신생아기에 B형간염 바이러스에 감염되면 대부분 바이러스를 평생 동안 몸에 지니고 있는 만성 B형간염 보유자가 됩니다.
- 소아 및 성인기에 B형간염 바이러스에 감염되면 주로 식욕부진, 피곤, 설사와 구토, 황달과 같은 급성 간염의 증상이 나타났다가 회복되지만 5-10%에서는 만성 B형간염 보유자가 됩니다.
- 만성 B형간염 보유자의 4명 중 1명은 나이가 들면서 만성간염, 간경변, 간암 등이 발생할 수 있으므로 예방이 무엇보다 중요합니다.

B형간염 바이러스의 전파경로

- 감염된 사람의 혈액이나 체액을 통해 전파됩니다.
 - 오염된 혈액이나 체액에 의한 감염(예 : 수혈, 오염된 주사기 사용, 혈액 투석, 침습적 검사 등)
 - B형간염 산모로부터 신생아에게 수산기 감염
 - B형간염 바이러스 보유자와 성 접촉
- ※ B형간염은 일상적인 활동(재채기, 기침, 껌안기, 음식 나눠먹기, 모유수유 등)으로는 감염되지 않습니다.

B형간염 예방접종 후 항체검사의 필요성

- 건강한 소아나 성인의 경우 예방접종 후 항체가 생겼는지 알아보기 위한 검사는 필요하지 않습니다. 다만, 다음 고위험군의 경우는 3회의 예방접종 완료 후 항체검사를 실시합니다.
 - B형간염 바이러스 보유자의 가족
 - 혈액제제를 자주 수혈 받아야 하는 환자
 - 혈액 투석을 받는 환자
 - HIV 감염인 등 면역저하자
 - 의료기관 종사자(B형간염 환자나 바이러스가 오염된 체액에 노출되는 상황이 반복되는 경우)
 - B형간염 바이러스 보유자와의 성 접촉자
 - B형간염 바이러스 보유자인 산모로부터 출생한 신생아

B형간염 추가접종은 필요하지 않습니다

- B형간염 3차 예방접종 후 1~3개월에 항체가가 최고로 나타나며, 이후 시간이 경과하면서 항체가가 감소하지만 기억면역이 유지되므로 건강한 소아나 성인의 경우 예방접종 후 일률적인 항체검사나 이에 따른 추가접종을 권장하지 않습니다.

<p>예방접종 편의서비스 3종 세트</p>	<p>예방접종의 모든 것 예방접종도우미 nip.cdc.go.kr</p>	<p>스마트하게 관리하는 모바일 앱 서비스 '예방접종도우미' 검색 후 다운로드</p>	<p>클릭 한번으로 무료발급! 온라인 예방접종 증명서 '민원24' 사이트를 통해 언제 어디서나</p>
--------------------------------	--	--	---